

ARTÍCULO ESPECIAL

RECOMENDACIONES DE CONSENSO SEPAR – AEER SOBRE LA UTILIDAD DE LA ECOGRAFIA TORÁCICA EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA O INFECCION CONFIRMADA CON COVID-19

Javier Pérez Pallarés. Servicio de Neumología. Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena.

jvperpal@separ.es

Javier Flandes Aldeyturriaga. Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz. - IIS-FJD CIBERES.

Madrid. jfa@fid.es

Enrique Cases Viedma. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. cases.enr@gva.es

Rosa Cordovilla Pérez. Servicio de Neumología. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

rcordovilla@usal.es

Autor de correspondencia:

Javier Pérez Pallarés.

Servicio de Neumología.

Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena

jvperpal@separ.es

RESUMEN

La gran afectación pulmonar producida por la infección del COVID-19 hace necesaria una herramienta diagnóstica rápida que complemente el test diagnóstico mediante PCR y que además sea útil en la evaluación de la progresión de las lesiones pulmonares. Ya que la mayoría de estas son periféricas en este documento de consenso proponemos el uso de la ecografía torácica para el diagnóstico precoz y la evaluación diaria de la progresión de lesiones pulmonares por un solo explorador sin necesidad de utilizar la TC de tórax.

En este consenso se propone la realización de una exploración sistemática ecográfica del tórax dividiéndolo por cuadrantes e identificando los signos ecográficos que se relacionen con el tipo de afectación parenquimatosa o pleural que tiene el paciente: líneas A, líneas B, condensación parenquimatosa, línea pleural y derrame pleural. Estos hallazgos nos facilitarán la toma de decisiones respecto al manejo del paciente, tanto en la decisión del lugar de ingreso del paciente como en el tipo de tratamiento que debemos pautar.

PALABRAS CLAVE:

Ecografía, Coronavirus, neumonía, líneas-B, pleura, derrame pleural

SEPAR - AEER CONSENSUS RECOMMENDATIONS ON THE USEFULNESS OF THE THORACIC ULTRASOUND IN THE MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH SUSPECTED OR CONFIRMED INFECTION WITH COVID-19

ABSTRACT

The great pulmonary affectation produced by the COVID-19 infection, requires a fast diagnostic tool that complements the diagnostic test by PCR and which is also useful in evaluating the progression of lung lesions. Since most of these are peripheral, in this consensus document we propose the use of thoracic ultrasound for early diagnosis and for the daily evaluation of the progression of lung lesions by a single explorer without the need to use the chest CT. In this consensus, it is proposed to carry out a systematic ultrasound examination of the thorax dividing it by quadrants and therefore identifying the ultrasound signs that are related to the type of parenchymal or pleural affectation that the patient has: A lines, B lines, parenchymal condensation, pleural line and pleural effusion. These findings will facilitate the decision making regarding the patient management, both when deciding the place of admission of the patient and the type of treatment to be prescribed

KEY WORDS:

Ultrasound, Coronavirus, Pneumonia, B-lines, pleura, pleural effusion

INDICE

1. **Introducción**
2. **Material necesario**
3. **Procedimiento**
4. **Zonas subsidiarias de exploración**
5. **Hallazgos ecográficos**
6. **Evolución de los hallazgos ecográficos de la enfermedad**
7. **Tablas**
8. **Referencias**

1. INTRODUCCION

La rápida progresión de la pandemia ocasionada por la infección de COVID-19 debido a su alta tasa de contagio, así como su rápida evolución a neumonías graves hacen necesario tanto un diagnóstico precoz de la enfermedad como una rápida detección de avance de su proceso neumónico.

Actualmente la tomografía computarizada de tórax (TC de tórax) se considera la herramienta más útil tanto para el diagnóstico precoz como para vigilar la evolución de la enfermedad (ya que la PCR tiene una alta tasa de falsos negativos en los primeros días). Los hallazgos más frecuentes son el vidrio deslustrado (88%) y la consolidación (31%), que con frecuencia aparecen en la periferia pulmonar y habitualmente combinado. En un mínimo porcentaje de casos se aprecian además engrosamiento del septo interlobular, bronquiectasias y engrosamiento pleural^{1,2}. Sin embargo la TC de tórax tiene el inconveniente del desplazamiento del paciente a otras zonas del hospital, lo que supone un riesgo de transmisión a otros pacientes y los propios sanitarios del hospital (en China e Italia del 3-10% de los infectados son personal sanitario³). La ecografía torácica, permite la realización de una prueba de imagen en la propia habitación del paciente, lo que evita estos inconvenientes.

Con este protocolo elaborado por el área de Técnicas y Trasplante de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Endoscopia Respiratoria y

Neumología Intervencionista, se propone la realización de una ecografía torácica a los pacientes con sospecha de infección por COVID-19 para confirmar su diagnóstico en los primeros síntomas y, en los casos confirmados, para realizar una rápida evaluación del estado de la enfermedad (tabla 1).

2. MATERIAL NECESARIO:

1. Ecógrafo (preferiblemente portátil para minimizar posibilidad de contagio)
2. Sonda lineal de alta frecuencia o sonda miniconvex ajustada a la frecuencia más alta posible para dicha sonda. En caso de sonda convex abdominal ajustar igualmente a la máxima frecuencia posible

Las medidas de aislamiento y limpieza posterior serán iguales a la de un pase de visita convencional, añadiendo una funda protectora de un solo uso para la sonda ecográfica.

3. PROCEDIMIENTO

Lo ideal es que el procedimiento sea llevado a cabo por un solo facultativo mientras que un ayudante anotará los hallazgos ecográficos observados.

Para llevar a cabo la exploración de una manera sistemática se divide la zona anterior del tórax en cuatro cuadrantes mediante una línea imaginaria que pasa por el esternón y otra que pasa por la areola que a su vez nos dividirá la zona axilar (entre línea axilar anterior y posterior) en superior e inferior (figura 1).

En cuanto a la zona posterior del tórax la se divide también en 4 zonas mediante la columna vertebral y una línea imaginaria que recorre horizontalmente la zona dorsal a la altura del borde inferior escapular y realizaremos la exploración de medial a lateral y de caudal a craneal (figura 2).

Dado que la afectación es bilateral en el 87% y multilobar en el 78,8% de los casos¹ la exploración ha de ser sistemática de todos los territorios. Comenzaremos siempre en las zonas anteriores más inferiores recorriendo longitudinalmente todo el espacio intercostal, de medial a lateral, y subiendo

por los distintos espacios intercostales hasta cubrir todos los cuadrantes. Una vez explorada cada zona se anotarán (preferiblemente por un ayudante) en la hoja de recogida de datos los hallazgos ecográficos

Hay dos tipos de escenarios: pacientes que permiten la sedestación y los que no lo permiten por su situación clínica. En el caso de estos últimos no se explorarán los territorios posteriores, si bien es importante, al explorar las zonas laterales, deslizar la sonda lo más dorsalmente posible ya que se ven afectados en el 80% de los pacientes¹.

4. ZONAS SUBSIDIARIAS DE EXPLORACIÓN

4.1 PACIENTE QUE NO PERMITE SEDESTACIÓN

4.1.1 *Decúbito:*

4.1.1.1 R1: antero-inferior derecho

4.1.1.2 R2: antero-superior derecho

4.1.1.3 R3: axilar-inferior derecho

4.1.1.4 R4: axilar-superior derecho

4.1.1.5 L1: antero-inferior izquierdo

4.1.1.6 L2: antero-superior izquierdo

4.1.1.7 L3: axilar-inferior izquierdo

4.1.1.8 L4: axilar-superior izquierdo

4.2 PACIENTE QUE PERMITE SEDESTACIÓN

4.2.1 *Sedestación:*

4.2.1.1 R5: inferior derecho

4.2.1.2 R6: superior derecho

4.2.1.3 L5: inferior izquierdo

4.2.1.4 L6: superior izquierdo

4.2.2 *Decúbito:*

4.2.2.1 R1: antero-inferior derecho

- 4.2.2.2 R2: antero-superior derecho
- 4.2.2.3 R3: axilar-inferior derecho
- 4.2.2.4 R4: axilar-superior derecho
- 4.2.2.5 L1: antero-inferior izquierdo
- 4.2.2.6 L2: antero-superior izquierdo
- 4.2.2.7 L3: axilar-inferior izquierdo
- 4.2.2.8 L4: axilar-superior izquierdo

5. HALLAZGOS ECOGRÁFICOS^{4,5,6,7,8}:

5.1 LINEAS A:

- 5.1.1 Presentes: normalidad
- 5.1.2 Ausencia: se corresponde con patrón en vidrio deslustrado

5.2 LINEAS B: presencia de más de 3 líneas B por campo ecográfico

- 5.2.1 B3: Separación de unos 3 mm entre las líneas B medidas a la altura de la línea pleural.

Correspondencia con:

- 5.2.1.1 Patrón de vidrio deslustrado en TAC de tórax.
- 5.2.1.2 Condensación parenquimatosa subyacente que no contacta directamente con pleura visceral

5.2.1.3 Edema alveolar: suele ser bilateral y distribuida de forma homogénea por ambos campos.

- 5.2.2 B7: Separación de unos 7 mm entre las líneas B medidas a la altura de la línea pleural.

Correspondencia con:

- 5.2.2.1 Neumonía con afectación intersticial predominante
- 5.2.2.2 intersticial crónica

5.3 CONDENSACION PARENQUIMATOSA

- 5.3.1 Broncograma aéreo
- 5.3.2 Broncograma fluido
- 5.3.3 Consolidación
- 5.3.4 Vasculatura

5.4 LINEA PLEURAL

5.4.1 Normal

5.4.2 Engrosamiento difuso y/o nodular

5.4.3 Discontinuidad

5.5 DERRAME PLEURAL

Es muy raro y podría representar una neumonía bacteriana añadida a la infección vírica

6. EVOLUCIÓN DE LOS HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DE LA ENFERMEDAD^{4,5,6,7,8}

La afectación se sitúa de forma preferente en la zona posterior de los lóbulos inferiores (LLII), sobre todo en las etapas iniciales.

La evolución en el tiempo de los hallazgos ecográficos sería la siguiente (tabla 2):

- Líneas A: dado que estas líneas se relacionan con zonas de parénquima pulmonar sano suelen verse únicamente en los primeros días y en lóbulos superiores, desapareciendo con el paso de días y volviendo a aparecer en la fase de absorción, coincidiendo con la resolución del cuadro

- Líneas B: en la etapa inicial se aprecia un aumento de líneas B de distribución focal y con una separación entre ellas, medida en la línea pleural, de unos 7 mm (líneas B7). A medida que los infiltrados pulmonares van aumentando en tamaño y se distribuyen por el resto del parénquima, las líneas B se van fusionando y disminuyendo el espacio de separación entre ellas en la línea pleural hasta llegar a 3 mm (líneas B3). Al mismo tiempo aumenta la distribución de las líneas B por ambos hemitórax hasta que comienza la fase de absorción en la que van desapareciendo progresivamente.

- Condensación parenquimatosa: No es típica en la fase temprana de la enfermedad. Puede aparecer a partir del cuarto día en zonas subpleurales. Comienza en forma de pequeñas consolidaciones que posteriormente van aumentando en número y tamaño, pudiendo apreciar en esta fase zonas con broncograma aéreo y líquido. En la etapa de absorción comienzan a desaparecer de forma progresiva

- Línea pleural: En los primeros días se visualizan zonas de pequeños engrosamientos difusos e irregulares. Con el avance de la enfermedad los engrosamientos se vuelven más nodulares con zonas de discontinuidad de la línea pleural que van desapareciendo si la enfermedad evoluciona favorablemente

- Derrame pleural: Es un hallazgo muy raro en todas las fases.

REFERENCIAS

- 1) Salehi S, Abedi A, Balakrishnan S, Gholamrezhad A. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients. *AJR Am J Roentgenol* 2020 Mar 14: 1-7. doi: 10.2214/AJR.20.23034).
- 2) Pan, Feng & Ye, Tianhe & Sun, Peng & Gui, Shan & Liang, Bo & Li, Lingli & Zheng, Dandan & Wang, Jiazheng & Hesketh, Richard & Yang, Lian & Zheng, Chuansheng. (2020). Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia. *Radiology*. 200370. 10.1148/radiol.2020200370
- 3) D. Buonsenso D, Piano A, Raffaelli F, Bonadia N, De Gaetano Donati, K, Franceschi F. *Point-of-Care Lung Ultrasound findings in novel coronavirus disease-19 pneumoniae: a case report and potential applications during COVID-19 outbreak*. *EurRevMedPharmacolSci* (2020) Vol. 24 - N. 5: 2776-2780. DOI: 10.26355/eurrev_202003_20549.
- 4) Manual SEPAR de procedimientos 33. Ecografía torácica. Perez Pallares J et al. Barcelona, 2019.
- 5) Peng, Q, Wang X, Zhang L and Chinese Critical Care Ultrasound Study Group (CCUSG). Findings of lung ultrasonography of novel corona virus pneumonia during the 2019–2020 epidemic. *Intensive Care Med* (2020). <https://doi.org/10.1007/s00134-020-05996-6>.
- 6) Mayo PH, Copetti R, Feller-Kopman D, Mathis G, Maury E, Mongodi S, Mojoli F, Volpicelli G, Zanobetti M (2019) Thoracic ultrasonography: a narrative review. *Intensive Care Med* 45:1200–1211. <https://doi.org/10.1007/s00134-019-05725-8>.

7) Huang Y, Wang S, Liu Y, Zhang Y, Zheng C, Zheng Y, Zhang C, Ming W, Yu M, Hu M . A Preliminary Study on the Ultrasonic Manifestations of Peripulmonary Lesions of Non-Critical Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19) (february 26, 2020) <https://dx.doi.org/10.21203/rs.2.24369/v1>.

8) Erika Poggiali, Alessandro Dacrema, Davide Bastoni, et al. Can Lung US Help Critical Care Clinicians in the Early Diagnosis of Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia?.PublishedOnline:Mar 13 2020. <https://doi.org/10.1148/radiol.2020200847>.

Tabla 1

FENOTIPOS CLINICOS	PCR	ACTITUD
CASO SOSPECHOSO <60 años sin comorbilidades¹ - Fiebre y/o mialgias y/o síntomas respiratorios - Sin crepitantes bilaterales - - No disnea y Sat> 94% - Rxtorax normal.	NO SE REALIZA	DOMICILIO <ul style="list-style-type: none"> • No analítica ni Eco torácica • ALTA sin PCR • Aislamiento domiciliario con recomendaciones tratamiento sintomático • Seguimiento telefónico
CASO SOSPECHOSO >60 años o comorbilidades¹o: - Alteración analítica - Hipoxemia leve (Sat: 91 – 94%) y Rx tórax normal - NEUMONIA NO GRAVE Fine I/II o CURB 65≤1, SatO2 >92%, Fr <18 - Presentes factores de mal pronostico ²	PCR +	INGRESO PLANTA ECOGRAFIA TORÁCICA DIARIA
	PCR -	VALORAR INGRESO PLANTA ECOGRAFIA TORÁCICA
NEUMONIA GRAVE Fine >II, o CURB ≥2 o SatO2 >90%, F respiratoria <28	PCR +	INGRESO PLANTA ECOGRAFIA TORÁCICA DIARIA
	PCR-	INGRESO PLANTA ECOGRAFIA TORÁCICA DIARIA
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE DISTRÉS RESPIRATORIO (PaO2/FiO2 < 150) ó SEPSIS/SHOCK SÉPTICO	PCR +	INGRESO EN UCI ECOGRAFIA TORÁCICA DIARIA
	PCR -	INGRESO EN UCI ECOGRAFIA TORÁCICA DIARIA

¹**FACTORES DE RIESGO:** Edad >60 años, EPOC, DM, HTA, obesidad, cardiopatía isquémica, neoplasia, hepatopatía crónica e inmunosupresión

²FACTORES DE MAL PRÓNOTICO: Linfopenia (< 600 células), ferritina > 500 ug/L, elevación de LDH, DD, CPK o troponina (no en fases precoces, pero su elevación confiere mal pronóstico), hiperbilirrubinemia, hipertransaminasemia, mal control glucémico/descompensación hiperglucémica

Tabla 2

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN ZONAS PATOLÓGICAS	ETAPA TEMPRANA (0-4 días)	ETAPA PROGRESIVA (5-8 días)	ETAPA MÁXIMA (9-13 días)	ETAPA ABSORCIÓN (≥ 14 días)
LINEAS A	Escasas Lóbulos superiores (LLSS)	NO	NO	Reaparición progresiva
LINEAS B	Predominante B7 focales	Aumento B3 y B7	B3 fusionadas y difusos	Resolución gradual
CONDENSACION PARENQUIMATOSA	NO	Subpleurales	Aumento	Resolución gradual
LINEA PLEURAL	Engrosamiento difuso	Engrosamiento difuso y/o nodular Discontinuidad	Engrosamiento difuso y/o nodular Discontinuidad	Resolución gradual
DERRAME PLEURAL	NO	RARO	RARO	RARO

Figura 1. Zonas para explorar en la parte anterior y lateral del tórax




Figura 2. Zonas para explorar en las zonas posteriores del tórax

