

# Archivos de Bronconeumologia

## Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2

--Borrador del manuscrito--

<b>Número del manuscrito:</b>	ARBR-D-20-00200
<b>Tipo de artículo:</b>	Artículo especial / Special Article
<b>Palabras clave:</b>	COVID-19; consenso; IRA
<b>Autor correspondiente:</b>	Manuel Luján, . Hospital Parc Taulí Sabadell, Spain
<b>Primer autor:</b>	César Cinesi Gómez
<b>Orden de autores:</b>	César Cinesi Gómez Óscar Peñuelas Rodríguez Manuel Luján, . Carlos Egea Santaolalla Juan Fernando Massa Jiménez
<b>Resumen:</b>	<p>Este consenso está enfocado a establecer los principales objetivos de actuación frente a la actual situación del COVID-19, estos objetivos son desde el Grupo de consenso: Asegurar que las direcciones de los hospitales tengan un protocolo establecido sobre el equipo de protección individual (EPI) para profesionales sanitarios. Asegurarse de que el personal sanitario esté entrenado en los procedimientos de colocación y retirada de los EPI.</p> <p>Valorar la capacidad de respuesta en diferentes escenarios del brote en los centros sanitarios mediante la utilización de la educación, la capacitación y la simulación de escenarios para. Optimización y anticipación de los recursos humanos sanitarios para mejorar la seguridad del personal sanitario y planteamiento de las posibles bajas laborales ante exposición de casos confirmados dentro de los circuitos de actuación de los servicios con recorte de las prestaciones laborales de los profesionales.</p> <p>Identificar centros hospitalarios de referencia que puedan manejar un posible aumento de casos con seguridad.</p> <p>Aumentar la capacidad total de las UCI y UCRI, preparar con antelación los recursos materiales, dotaciones de equipos y personal sanitario las áreas de hospitalización, y Urgencias donde agrupar a enfermos con COVID-19 positivo, en cada hospital si es necesario.</p> <p>Establecer un protocolo de clasificación para identificar casos sospechosos, posibles y confirmados para dirigir circuitos de actuación correcta dentro del hospital.</p> <p>Establecer un protocolo preestablecido del manejo de los casos probados con COVID-19 positivo con criterios de gravedad.</p> <p>Establecer objetivos claros para el cuidado de los enfermos y sus familiares y política de visitas de los enfermos ingresados.</p>



Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

# Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS- CoV-2

## Autores

*César Cinesi Gómez.* M.D. PhD. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Murciano de Salud. Director del Máster Oficial en Medicina de Urgencias y Emergencias. Murcia. España.

*Óscar Peñuelas Rodríguez.* M.D. PhD. Servicio de Medicina Intensiva y Grandes Quemados Hospital Universitario de Getafe, Madrid. CIBER de Enfermedades Respiratorias, CIBERES, España.

*Manel Luján Torné.* Servicio de Neumología. Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí.

Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Centro de investigación Biomédica en Red. (CIBERES) España.

*Carlos Egea Santaolalla.* Jefe Unidad Funcional de Sueño. Hospital Universitario ARaba. OSI araba: Vitoria-Gasteiz

*Juan Fernando Masa Jiménez.* Servicio de Neumología, Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres; CIBER de enfermedades respiratorias (CIBERES), Madrid; Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE).

*Javier García Fernández.* Servicio de Anestesia, Cuidados Críticos quirúrgicos y dolor. Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid)

*José Manuel Carratalá Perales.* Servicio de Urgencias, Unidad de Corta Estancia y Hospitalización a Domicilio, Hospital General de Alicante; Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL- Fundación FISABIO), Alicante, España.

*Sarah Béatrice Heili-Frades.* Jefe Asociado de Neumología. Responsable de la UCIR. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. CIBERES, REVA, EMDOS.

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

*Miquel Ferrer Monreal.* Servei de Pneumologia, Institut Clínic de Respiratori, Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS, CibeRes (CB06/06/0028), Universitat de Barcelona.

*José M. de Andrés Nilsson.* Médico de Urgencias. Servicio de Urgencias. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. España.

*Eva Lista Arias.* Médico adjunto Servicio de Urgencias ParcTaulí Hospital Universitari. Sabadell. España.

*Juan Luis Sánchez Rocamora.* Servicio de Urgencias. Hospital General de Villarrobledo. Albacete. Murcia.

*José Ignacio Garrote.* MD, PhD. Médico de Emergencias GUETS, SESCAM. Coordinador docente Eliance. España.

*Miguel J. Zamorano Serrano.* Médico Adjunto de Urgencias. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

*Juan Antonio Gómez Company.* Servicio de Urgencias. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

*Mónica González Martínez.* Unidad de sueño y ventilación. Neumología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. IDIVAL. Universidad de Cantabria

*Eva Farrero Muñoz.* Servei de Pneumologia Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat.

*Olga Mediano San Andrés.* Hospital Universitario de Guadalajara. S. Neumología. Ciberes. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares

*Gemma Rialp Cervera.* Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma de Mallorca

*Arantxa Mas Serra.* Servei de Medicina Intensiva. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi Hospital General d'Hospitalet.

*Gonzalo Hernández Martínez.* MD, PhD. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Virgen de la Salud.

Candelaria de Haro López. Área de Críticos. Corporación Sanitaria i Universitaria ParcTaulí, Sabadell, España. Ciber Enfermedades Respiratorias (CIBERES). Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.

*Oriol Roca Gas.* Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Vall d'Hebron. Institut de Recerca Vall d'Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España. Ciber Enfermedades Respiratorias (CIBERES). Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.

*Ricard Ferrer Roca.* Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España. Shock, OrganDysfunction and Resuscitation Research Group, Vall d'Hebron Institut de Recerca, Barcelona, España. CIBER de Enfermedades Respiratorias, CIBERES.

*Antonio Romero Berrocal.* Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid).

*Carlos Ferrando Ortola.* MD, PhD. Jefe de Sección Área de Cuidados Intensivos Quirúrgicos. Servicio de Anestesia y Cuidados Intensivos. Hospital Clínic Barcelona. España.

## Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y podrán ser modificadas si la situación epidemiológica y las opciones terapéuticas así lo requieren.

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

# Índice

1		
2		
3		
4		
5	<b>ÍNDICE .....</b>	<b>1</b>
6		
7	<b>INTRODUCCIÓN GENERAL .....</b>	<b>2</b>
8		
9	<b>RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DEL FRACASO RESPIRATORIO AGUDO SECUNDARIA</b>	
10		
11	<b>A COVID-19 .....</b>	<b>5</b>
12		
13	OBJETIVOS.....	5
14		
15	INTRODUCCIÓN .....	5
16		
17	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DEL SRNI EN EL COVID-19 .....	5
18		
19	<b>RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN EN EL PACIENTE SOMETIDO</b>	
20		
21	<b>A SRNI .....</b>	<b>9</b>
22		
23	OBJETIVO.....	9
24		
25	INTRODUCCIÓN .....	9
26		
27	RECOMENDACIONES GENERALES .....	9
28		
29	RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN EL TIPO DE SRNI.....	11
30		
31	OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL:.....	11
32		
33	TERAPIA DE ALTO FLUJO CON CÁNULAS NASALES: .....	11
34		
35	VENTILACION MECANICA NO INVASIVA .....	11
36		
37	TERAPIA INHALADA .....	14
38		
39	<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		

## Introducción general

El documento que presentamos está elaborado en consenso con las sociedades científicas implicadas en el fracaso respiratorio agudo en el paciente adulto y se dirige a una descripción más minuciosa sobre las recomendaciones para el uso de soporte respiratorio no invasivo (SRNI) en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) secundaria a la infección por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad denominada COVID-19 como complemento a la información que emite el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSC)<sup>1,2</sup>, que se actualiza frecuentemente, y que establece una serie de recomendaciones generales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado recientemente la enfermedad por el SARS-CoV-2 (COVID-19)<sup>3</sup> como una emergencia de salud pública de alarma internacional. Esta epidemia en curso de la enfermedad COVID-19 es devastadora, a pesar de la amplia implementación de medidas de control. En realidad, existen importantes disparidades regionales en la disponibilidad y accesibilidad de los recursos de atención médica entre los más de 70 países afectados actualmente. Tales disparidades podrían explicar en parte las bajas tasas de mortalidad, a pesar de la alta incidencia de casos. En este sentido, las diferentes autoridades sanitarias y los gobiernos han elaborado unos planes de contingencia para manejar los brotes locales<sup>4</sup>. Estas medidas son esenciales para controlar la epidemia, proteger a los profesionales sanitarios en primera línea y mitigar la gravedad de los desenlaces de los enfermos.

Los resultados del reciente análisis de las características clínicas en una cohorte seleccionada de 1.099 enfermos de COVID-19 en toda China<sup>5</sup> han mostrado que hasta el 15% (173/1.099) desarrollaron enfermedad grave según los criterios clínicos de neumonía comunitaria grave de la American Thoracic Society<sup>6</sup>, y estos con enfermedad grave el 20,6% presentaron como desenlace compuesto o ingreso en las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (33/173, 19%), o el uso de ventilación mecánica, tanto



Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1 invasiva como no invasiva, (81/173, 46%) o muerte (14/173, 8%).  
2 Complementariamente, el 2,9% (5/173) requirió sistemas de oxigenación extracorpórea.  
3

4 Este escenario de ser extrapolado a la situación del actual brote en España nos  
5 sitúa en la necesidad de anticipar y demandar un plan de contingencia a las autoridades  
6 sanitarias nacionales y territoriales para el manejo de los recursos sanitarios y de  
7 seguridad para los profesionales que incluyan los circuitos de utilización de áreas  
8 específicas de los centros hospitalarios (UCI, Unidades de Cuidados Respiratorios  
9 Intermedios (UCRI), Urgencias, plantas de hospitalización) dotadas de medios y  
10 personal sanitario capaces de afrontar con seguridad y eficiencia el desafío  
11 epidemiológico del control y tratamiento del brote en España de la enfermedad COVID-  
12 19. Además, durante las epidemias previas por virus, SARS (Síndrome Respiratorio  
13 Agudo Grave) y MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio), el personal sanitario  
14 presentó una alta tasa de infección, de un 18,6% de casos durante el brote de MERS y  
15 un 21% de casos durante el de SARS<sup>7,8</sup>.  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

28 Por ello, desde los grupos de trabajo y de las sociedades científicas responsables  
29 se deben establecer unos planes de contingencia que prevean la eventual situación  
30 crítica para la optimización de recursos materiales y humanos para estar preparados con  
31 anticipación ante posibles escenarios desmesurados de demanda  
32 imprevista. Concretamente, desde el Grupo de Consenso, dentro de este plan de  
33 contingencia, creemos que se debería incluir:  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

- 42 1. Asegurar que las direcciones de los hospitales tengan un protocolo establecido  
43 sobre el equipo de protección individual (EPI) para profesionales sanitarios.  
44 Asegurarse de que el personal sanitario esté entrenado en los procedimientos de  
45 colocación y retirada de los EPI.  
46  
47
- 48 2. Utilización de la educación, la capacitación y la simulación de escenarios para  
49 valorar la capacidad de respuesta en diferentes escenarios del brote en los  
50 centros sanitarios. Optimización y anticipación de los recursos humanos  
51 sanitarios para mejorar la seguridad del personal sanitario y planteamiento de las  
52 posibles bajas laborales ante exposición de casos confirmados dentro de los  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1 circuitos de actuación de los servicios con recorte de las prestaciones laborales  
2 de los profesionales.  
3

- 4 3. Identificación de centros hospitalarios de referencia que puedan manejar un  
5 posible aumento de casos con seguridad.  
6
- 7 4. Aumentar la capacidad total de las UCI y UCRI, preparar con antelación los  
8 recursos materiales, dotaciones de equipos y personal sanitario las áreas de  
9 hospitalización, y Urgencias donde agrupar a enfermos con COVID-19 positivo,  
10 en cada hospital si es necesario.  
11
- 12 5. Establecer un protocolo de clasificación para identificar casos sospechosos,  
13 posibles y confirmados para dirigir circuitos de actuación correcta dentro del  
14 hospital.  
15
- 16 6. Establecer un protocolo preestablecido del manejo de los casos probados con  
17 COVID-19 positivo con criterios de gravedad.  
18
- 19 7. Establecer objetivos claros para el cuidado de los enfermos y sus familiares y  
20 política de visitas de los enfermos ingresados.  
21

22 En conclusión, no podemos predecir cuántos enfermos graves afectados por la  
23 enfermedad por COVID-19 recibiremos, pero debemos anticipar los escenarios, ajustar  
24 los recursos de la forma más racional posible, en consonancia con experiencias de otros  
25 países afectados, hacer lo mejor que podemos para estar preparados y trabajar juntos  
26 para superar la epidemia.  
27

28 Las recomendaciones de este documento están basadas, de forma análoga, en los  
29 estudios de otras pandemias víricas (gripe, SARS, MERS) y en las últimas  
30 publicaciones sobre el COVID-19. Por tanto, el nivel de evidencia actual es bajo dada la  
31 falta de robustez metodológicas y por la propia naturaleza de la enfermedad. Este  
32 documento se actualizará según la evolución del conocimiento y los cambios de las  
33 recomendaciones de los organismos y sociedades nacionales e internacionales.  
34

# Recomendaciones generales para el manejo del fracaso respiratorio agudo secundaria a COVID-19

## Objetivos

**Identificar adecuadamente a los pacientes con IRA susceptibles de iniciar soporte respiratorio no invasivo (SRNI).**

**Conocer los procesos de alto riesgo de fracaso del SRNI.**

## Introducción

La IRA es la causa más frecuente mortalidad en los pacientes con gripe, y con infecciones virales en general<sup>9</sup>. Con respecto a la COVID-19 (la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2), el 3,4% de los pacientes infectados en China presentaron un síndrome de distrés respiratorio agudo, lo que supone el 40,3% de los pacientes que presentaron una patología grave<sup>5</sup>. Por tanto, es muy importante aplicar una estrategia terapéutica para delainsuficiencia respiratoria aguda secundaria a la infección por COVID-19.

Una parte fundamental del manejo de la IRA en los pacientes con COVID-19 es la monitorización, preferiblemente no invasiva. Estos pacientes precisan ser ubicados en una habitación individual, idealmente con presión negativa, lo que conlleva la necesidad de un control centralizado de la monitorización (pulsioximetría, frecuencia respiratoria) y, preferentemente, con videovigilancia.

## Estrategia terapéutica del SRNI en el COVID-19

Al igual que otros procesos que provocan IRA, en la infección por SARS-CoV-2 se puede utilizar la estrategia terapéutica respiratoria propuesta por *Scala and Heunks*<sup>10</sup>. La oxigenoterapia convencional consiste en la administración de oxígeno a

## Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1 diferentes concentraciones y es la base de la pirámide terapéutica. El siguiente escalón  
2 es la terapia de alto flujo mediante cánulas nasales(TAFCN). Consiste en la utilización  
3 de una mezcla de gas a flujos altos (hasta 60 lpm) con proporciones variables ( $FiO_2$ ) de  
4 aire y oxígeno administrados a través de una cánula nasal. Este gas administrado debe  
5 estar caliente y humidificado al 100%<sup>11</sup>. Las ventajas con respecto al oxígeno  
6 convencional son un aporte constante de  $FiO_2$ , reducción del espacio muerto y la  
7 generación de una presión positiva, que conlleva una redistribución de líquido  
8 intraalveolar y reclutamiento alveolar<sup>12</sup>. El siguiente escalón es la ventilación mecánica  
9 no invasiva (VMNI). La principal característica de la VMNI es su uso en ventilación  
10 espontánea, por lo que la sedación es nula o baja<sup>13</sup>. El penúltimo escalón, es la  
11 ventilación mecánica invasiva (VMI). En este caso, se suele utilizar una ventilación en  
12 modo controlado y precisa de intubación traqueal<sup>10</sup>. El último escalón es la membrana  
13 de oxigenación extracorpórea (ECMO). La ECMO es una forma de soporte vital  
14 extracorpóreo que puede proporcionar un soporte completo (o parcial) de la función  
15 cardiopulmonar. Consiste en introducir una cánula específica en un gran vaso sanguíneo  
16 conectando a una membrana que oxigena la sangre y elimina el dióxido de carbono al  
17 mismo tiempo que una bomba impulsa la sangre en el circuitosanguíneo<sup>14</sup>. Actualmente  
18 las terapias respiratorias que definen el SRNI son la TAFCN y la VMNI.  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37

38 A nivel orientativo, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios  
39 para iniciar el soporte respiratorio, en la IRA secundaria a COVID-19, serían los  
40 siguientes<sup>15</sup>:  
41  
42  
43  
44  
45

- Criterios clínicos:

- Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico
- Taquipnea mayor de 30 rpm.

- Criterios gasométricos:

- $PaO_2/FiO_2 < 200$  (o la necesidad de administrar una  $FiO_2$  superior a 0,4 para conseguir una  $SpO_2$  de al menos 92%).
- Fallo ventilatorio agudo ( $pH < 7,35$  con  $PaCO_2 > 45$  mm Hg).

## Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

En pacientes sin ninguno de los criterios previos el tratamiento indicado inicialmente sería la oxigenoterapia convencional. Ante la presencia de algún criterio se indicaría soporte respiratorio ya sea invasivo o no invasivo. El uso del SRNI para el SARS y otras pandemias virales es controvertido, con tasas de fracaso de la VMNI alrededor del 30%<sup>16</sup>.

Más recientemente, la VMNI también se usó en pacientes con la IRA por Gripe A H1N1, con tasas de fracaso que oscilaron entre el 13% y el 77%<sup>17-19</sup>. A pesar de la incertidumbre de la evidencia y la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, los datos positivos de la mayoría de los estudios observacionales sugieren que se puede plantear su uso en pacientes cuidadosamente seleccionados en centros con experiencia y en un ambiente protegido (idealmente habitaciones con presión negativa). En la presente epidemia de China el 5,1% de los pacientes necesitaron VMNI, un 2,3% con VMI y un 0,5% ECMO<sup>5</sup>. Así, la elección terapéutica también dependerá de las patologías de base del paciente, principalmente respiratorias, de la ubicación del enfermo (habitación con presión negativa, habitación individual cerrada con recambio del aire) y de la posibilidad de eventual necesidad de procedimientos generadores de aerosoles, por lo que, de forma global, podríamos encontrarnos con tres escenarios clínicos:

1º) Pacientes sin patología previa (“IRA de novo”) con insuficiencia respiratoria hipoxémica y, por tanto, susceptibles de escalar el tratamiento hasta la ECMO. La tasa de fracasos del SRNI en este escenario clínico, principalmente en la VMNI, es extremadamente alta. Además, existe evidencia de mayor mortalidad si se produce retraso en el inicio de la VMI. Por tanto, **no recomendamos la utilización de SRNI en estos pacientes**<sup>1,20,21</sup>. Sólo se podría plantear en pacientes muy seleccionados y, siempre y cuando, se cumplan **todos** los siguientes criterios<sup>19,21-27</sup>:

- $PaO_2/FiO_2 > 100$ .
- Ausencia de fallo multiorgánico (APACHE <20).
- Es necesario de un equipo multidisciplinar experto con monitorización estrecha, por lo que se recomienda realizarlo en una UCI o UCRI.

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

- Intubación oro-traqueal (IOT) precoz en la siguiente hora si no existen criterios de mejoría. En este sentido, a parte de los criterios tradicionales de intubación, se podría considerar la intubación en aquellos pacientes tratados con TAFCN que presenten un índice de ROX ( $(\text{SpO}_2/\text{FiO}_2) / \text{Frecuencia respiratoria}$ )  $<3$ ,  $<3,5$  y  $<4$  a las 2, 6 y 12h del inicio del tratamiento con TAFCN. De la misma manera, se podría considerar la intubación en aquellos pacientes que presenten un índice HACOR  $>5$  después de 1 o 12 horas de iniciar el tratamiento con VNI.

Extrapolando la evidencia en IRA “de novo” la TAFCN sería la modalidad de primera elección<sup>21,28</sup>. La VMNI se sitúa como segunda opción en caso de respuesta insuficiente y sin criterios inmediatos de VMI.

2º) Pacientes con fracaso hipoxémico, orden de no IOT y techo terapéutico en la VMNI: en estos pacientes estaría indicado el inicio de SRNI **siempre y cuando estén aseguradas las medidas preventivas**. En este contexto es fundamental establecer con el paciente y la familia los objetivos de tratamiento, delimitando el techo terapéutico. En general, se recomienda iniciar el tratamiento con TAFCN antes que con VMNI<sup>21,28</sup>. Para la utilización del SRNI recomendamos seguir las siguientes consideraciones<sup>29,30</sup>:

- Titular la  $\text{FiO}_2$  para conseguir una  $\text{SpO}_2$  objetivo entorno al 95%<sup>31</sup>.
- En caso de usar TAFCN utilizar flujos superiores a 50 lpm, si es posible iniciar con 60 lpm.
- En caso de usar VMNI utilizar PEEP altas y presiones de soporte bajas (con el objetivo de obtener un  $\text{VTe} < 9 \text{ ml/kg}$  de peso ideal)<sup>31,32</sup>.

3º) Pacientes con exacerbación grave de la EPOC con fallo respiratorio hipercápnico agudo o agudizado: realizar una prueba terapéutica con SRNI, especialmente con VMNI. La TAFCN puede ser útil en estos pacientes en el caso de no tolerancia a la VMNI o para los descansos de la VMNI<sup>33-36</sup>.

# Recomendaciones para la prevención y control de la infección en el paciente sometido a SRNI

## Objetivo

**Limitar la transmisión de la infección tanto al personal sanitario como a otros pacientes.**

## Introducción

La utilización del SRNI es una práctica de especial riesgo para la transmisión del SARS-CoV-2<sup>37-40</sup>. La capacidad del SARS-CoV-2 para infectar los trabajadores sanitarios han sido confirmada, aunque todavía no se pueden establecer comparaciones con MERS y SARS<sup>40</sup>. Por ello, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se han elaborado unas recomendaciones para el manejo de la enfermedad y este documento pretende difundir las medidas que limiten la transmisión de la infección al personal sanitario<sup>2,39</sup>. **Para poder utilizar el SRNI en un paciente con sospecha o infección por SARS-CoV-2 es indispensable seguir las recomendaciones generales preventivas. En este contexto, es necesario que las administraciones dispongan de los materiales necesarios para un uso seguro del SRNI.**

## Recomendaciones generales

- El personal sanitario que atienda casos en investigación o confirmados para infección por COVID-19 en tratamiento con SRNI deben llevar un equipo de protección individual (EPI) para la prevención de infección<sup>2,22,37,39,41</sup> durante los procedimientos de generación de aerosoles que se han asociado con un aumento del riesgo de transmisión de patógenos aéreos. Las medidas preventivas deben estar dirigidas a microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya:

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

- Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad.
  - Gafas de protección de montura integral.
  - Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano.
  - Guantes.
  - Batas de protección microbiológica impermeables de manga larga.
- La ubicación del paciente en el ámbito hospitalario se relaciona con la posibilidad de realizar procedimientos generadores de aerosoles. En este sentido, la evidencia disponible acerca de los dispositivos de SRNI como procedimientos invasivos y el riesgo de transmisión de patógenos respiratorios a los profesionales sanitarios se relacionan con más consistencia en los casos de intubación orotraqueal y pacientes con vía aérea artificial, así como con la ventilación no invasiva, aunque los resultados proceden de estudios limitados de muy baja calidad, lo que dificulta la interpretación (ANEXO 1). Se recomienda ubicar al paciente en una habitación que disponga de presión negativa. Si este tipo de sala no está disponible, se le atenderá al paciente en una habitación o box de uso individual con baño, con ventilación natural o climatización independiente. La puerta de la habitación deberá permanecer siempre cerrada<sup>39</sup>.
  - Para el traslado intrahospitalario el paciente y el profesional que traslade al paciente llevarán una mascarilla quirúrgica. Durante el traslado se cubrirá la cama del paciente con una sábana limpia desechable que se eliminará como residuo del grupo III<sup>39</sup>.



## Recomendaciones específicas según el tipo de SRNI

### OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL:

*El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social recomienda administrar el oxígeno a través de mascarillas con filtro de aire exhalado, pero estas mascarillas no están disponibles de forma universal en nuestro entorno.* A falta de disponer de las mismas, podría emplearse de forma segura una mascarilla quirúrgica por encima de las gafas nasales o la mascarilla de oxígeno para limitar la dispersión del virus. No hay estudios que comparen la seguridad en la reducción de la dispersión del SARS-CoV-2 entre el primer tipo de máscara y la protección con mascarilla quirúrgica<sup>39</sup>, pero la administración de oxígeno se considera un procedimiento generador de aerosoles de riesgo bajo<sup>39-40</sup>.

### TERAPIA DE ALTO FLUJO CON CÁNULAS NASALES:

**Se recomienda seguir las recomendaciones generales mencionadas y mantener una distancia mínima de 2 metros con otros pacientes y el personal sanitario no adecuadamente protegido<sup>42</sup>.** Aunque en el momento actual existe incertidumbre en relación con la dispersión de partículas en este modo terapéutico, la colocación de una mascarilla quirúrgica por encima de las cánulas nasales, aunque no estudiada, podría ser una posibilidad ante una situación extrema.


### VENTILACION MECANICA NO INVASIVA

Se recomienda mantener una distancia mínima de 2 metros con otros pacientes y el personal sanitario no adecuadamente protegido.

En general, de acuerdo con la evidencia disponible, no hay contraindicaciones para el uso de los SRNI en enfermos con COVID-19, pero la terapia respiratoria utilizada no sólo dependerá de la gravedad de la insuficiencia respiratoria sino de la disponibilidad de una ubicación que cumpla las recomendaciones de aislamiento y seguridad de la Organización Mundial de la salud (OMS). Probablemente, los casos más

## Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1 graves, que vaticinen una intubación probable y rápida, deberían ubicarse en las UCI  
2 para evitar posibles retrasos en la intubación que resulten desfavorables para la  
3 evolución de los enfermos(Figura 1).  
4  
5  
6  
7



### Elección de la configuración del respirador:

- Aunque en el momento actual existendudas en relación con la dispersión de partículas en el COVID-19, en la epidemia del SARS se publicaron algunos artículos que mostraban una dispersión de partículas con la VMNI de circuito único y puerto exhalatorio de no más de 4 pies (1,25 m)<sup>8,43,44</sup>.
- Utilizar preferiblemente configuraciones de doble rama ya que aportan hermetismo al circuito respiratorio tanto inspiratorio como espiratorio. Se

## Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

deberán colocar filtros antimicrobianos de alta eficiencia en la rama espiratoria para evitar la contaminación inversa desde el paciente al respirador<sup>39</sup>.

- En caso de no disponer de sistemas de doble rama y tener que emplear ventiladores de rama única, deberemos localizar en la tubuladura única el orificio espiratorio y colocar un filtro antimicrobiano de alta eficiencia y baja resistencia para minimizar la dispersión del gas exhalado que pueda contaminar el aire ambiente. Parece factible, asimismo, interponer una pieza en T en el circuito para colocar el filtro y la fuga intencional distal al mismo, aunque debe tenerse en cuenta el incremento de espacio muerto
- En caso de no poder acoplar un filtro antimicrobiano de alta eficiencia en el orificio espiratorio, se deberá colocar un filtro antimicrobiano de alta eficiencia entre la interfase paciente/ventilador (sin orificios espiratorios) y el circuito. En este caso, el aumento de la resistencia podría requerir modificar los parámetros del ventilador en el sentido de incrementar el nivel de presión de soporte.
- Una alternativa factible a los sistemas de doble rama o rama única con fuga es el empleo de sistemas monorrama con válvula activa y colocación de filtro antimicrobiano a la salida de la válvula activa.
- No recomendamos utilizar HME (Heat and Moisture Exchangers)<sup>45</sup>.

### Elección del tipo de interfase:

La interfase es el dispositivo de conexión que facilita la relación física pero también funcional entre dos elementos independientes: ventilador y paciente. Es un elemento indispensable en la VMNI, vehiculando la presión positiva hacia el enfermo sin ningún componente artificial introducido en la vía aérea. Las recomendaciones para el uso de la interfase en la infección por SARS-CoV-2 son<sup>40,41,46,47</sup>:

- La interfase recomendada es aquella sin orificio espiratorio, no utilizando puertos accesorios si los hubiera.
- La utilización del *Helmet* debería ser prioritaria en caso de disponer de esta interfase y conocer su técnica de colocación y mantenimiento.

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

- En términos generales, se recomienda utilizar la máscara facial total como primera alternativa y, en su defecto, oronasal.
- Es preciso atender y vigilar de forma estricta los puntos de fuga perimáscara, especialmente en las interfaces oro-nasales, primero para evitar lesiones sobre la piel del paciente con la protección adecuada y, por otro lado, mantener el hermetismo al circuito que evita la exhalación del aire infectado. Debe evitarse los parches protectores por aumento de la fuga, recomendándose la aplicación repetida de aceites hiperoxigenados.
- No se recomienda hacer uso de la interfase nasal ya que genera más aerosoles, y porque, además, en general en la infección por SARS-CoV-2 se trata de un fallo hipoxémico agudo.

- **Elección del tipo de codo<sup>46</sup>:**

- Recomendamos el uso de codo sin válvula anti-asfixia. Por lo general son de color azul. El empleo de este tipo de codos nos obliga a extremar la vigilancia del paciente ante posibles fallos del equipo de ventilación. Considerando el balance riesgo/beneficio (asfixia vs dispersión) y que estos pacientes están ubicados en boxes de alta complejidad al cuidado continuo de personal sanitario especializado es poco probable la desconexión accidental no detectada ni corregida a tiempo.
- Desaconsejamos el uso de codo anti-*rebreathing* (que además alberga válvula anti-asfixia) por el riesgo de mayor dispersión del aire espirado.

### TERAPIA INHALADA<sup>1,39</sup>

La administración de terapia inhalada se realizará preferentemente con dispositivo MDI y cámara espaciadora. Sin embargo, es importante señalar que en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda es difícil que puedan recibir el

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1 medicamento de forma efectiva con estos dispositivos. Si se precisa utilizar  
2 aerosolterapia, se recomienda utilizar dispositivos de malla vibrante con pipeta bucal o  
3 mascarilla limitando la dispersión poniendo encima una mascarilla quirúrgica. Debe  
4 tenerse en cuenta que si se utiliza pipeta bucal con sistema anti dispersión las dosis de  
5 fármaco depositado (especialmente importante en el caso de los broncodilatadores  
6 beta<sub>2</sub>-adrenérgicos) pueden ser mayores y requerir un ajuste de dosis.  
7  
8  
9  
10  
11  
12

13  
14 Se desaconsejan los sistemas jet por la mayor capacidad de dispersión de  
15 partículas al ambiente. De ser necesarios es imprescindible colocar mascarilla  
16 quirúrgica al paciente durante la nebulización.  
17  
18  
19  
20  
21

22 Para utilizar terapia inhalada junto con SRNI recomendamos observar los  
23 siguientes puntos:  
24  
25  
26  
27

- 28 • La recomendación general para administrar la terapia inhalada es utilizar  
29 cartuchos presurizados con un adaptador o cámara espaciadora. En caso de  
30 utilizar VMNI se colocará en la rama inspiratoria del circuito, coordinando la  
31 pulsación con la inspiración del paciente.  
32  
33
- 34 • Si utilizamos aerosolterapia se recomiendan de elección los nebulizadores de  
35 malla vibrante con adaptación al codo de la interfase. Como segunda opción, se  
36 puede utilizar el nebulizador de malla vibrante con una pieza en T al circuito de  
37 la VMNI. Al tratarse de un “sistema cerrado” no se dispersan al ambiente si la  
38 fuga perimascarilla está bien controlada.  
39  
40
- 41 • Los nebulizadores tipo jet con tubo en T generan mayores turbulencias y  
42 partículas de mayor tamaño, y mayor facilidad de dispersión de partículas.  
43  
44
- 45 • Si utilizamos TAFCN lo ideal es utilizar cartuchos presurizados con cámara  
46 espaciadora, pipeta con nebulizador tipo malla vibrante o un dispositivo de  
47 malla acoplado a la rama seca de la cámara reservorio de agua.  
48  
49
- 50 • En general reduciremos la presión soporte utilizada en VMNI y la temperatura si  
51 utilizamos TAFCN.  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

## Bibliografía

1. Ministerio de Sanidad. Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19). Disponible en: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo\\_manejo\\_clinico\\_COVID-19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf)
2. Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Disponible en: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento\\_COVID\\_19.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf)
3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. (<https://www.who.int>).
4. Ji Y, Ma Z, Peppelenbosch MP, Pan Q. Potential association between COVID-19 mortality and health-care resource availability. *Lancet Glob Health*. 2020;
5. Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *N Engl J Med*. 2020;NEJMoa2002032.
6. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200:e45-67.
7. Malave A, Elamin EM. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)-Lessons for Future Pandemics. *Virtual Mentor*. 2010;12:719-25.
8. Park J-E, Jung S, Kim A, Park J-E. MERS transmission and risk factors: a systematic review. *BMC Public Health*. 2018;18:574.
9. Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, Englund JA, File TM, Fry AM, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenza. *Clinical Infectious Diseases*. 2019;68:e1-47.
10. Scala R, Heunks L. Highlights in acute respiratory failure. *European Respiratory Review*. 2018;27:180008.

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

11. Zhao H, Wang H, Sun F, Lyu S, An Y. High-flow nasal cannula oxygen therapy is superior to conventional oxygen therapy but not to noninvasive mechanical ventilation on intubation rate: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2017;21:184.
12. Roca O, Hernández G, Díaz-Lobato S, Carratalá JM, Gutiérrez RM, Masclans JR, et al. Current evidence for the effectiveness of heated and humidified high flow nasal cannula supportive therapy in adult patients with respiratory failure. *Crit Care*. 2016;20:109.
13. Davidson C, Banham S, Elliott M, Kennedy D, Gelder C, Glossop A, et al. British Thoracic Society/Intensive Care Society Guideline for the ventilatory management of acute hypercapnic respiratory failure in adults. *BMJ Open Respiratory Research*. 2016;3:e000133.
14. Tramm R, Ilic D, Davies AR, Pellegrino VA, Romero L, Hodgson C. Extracorporeal membrane oxygenation for critically ill adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;1:CD010381.
15. Pisani L, Nava S. Noninvasive ventilation in acute hypercapnic respiratory failure. *Semin Respir Crit Care Med*. 2014;35:501-6.
16. Cheung TMT, Yam LYC, So LKY, Lau ACW, Poon E, Kong BMH, et al. Effectiveness of noninvasive positive pressure ventilation in the treatment of acute respiratory failure in severe acute respiratory syndrome. *Chest*. 2004;126:845-50.
17. Belenguer-Muncharaz A, Reig-Valero R, Altaba-Tena S, Casero-Roig P, Ferrándiz-Sellés A. [Noninvasive mechanical ventilation in severe pneumonia due to H1N1 virus]. *Med Intensiva*. 2011;35:470-7.
18. Estenssoro E, Ríos FG, Apezteguía C, Reina R, Neira J, Ceraso DH, et al. Pandemic 2009 influenza A in Argentina: a study of 337 patients on mechanical ventilation. *Am J Respir Crit Care Med*. 2010;182:41-8.
19. Masclans JR, Pérez M, Almirall J, Lorente L, Marqués A, Socías L, et al. Early non-invasive ventilation treatment for severe influenza pneumonia. *Clin Microbiol Infect*. 2013;19:249-56.
20. Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, Hess D, Hill NS, Nava S, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory

1 failure. EurRespir J [Internet]. 2017 [citado 1 de junio de 2018];50. Disponible en:  
2 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5593345/>  
3

4 21. WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel  
5 coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected. Disponible en:  
6 [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf)  
7 [cov.pdf](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf)  
8  
9

10 22. Bouadma L, Lescure F-X, Lucet J-C, Yazdanpanah Y, Timsit J-F. Severe  
11 SARS-CoV-2 infections: practical considerations and management strategy for  
12 intensivists. IntensiveCareMed [Internet]. 2020 [citado 3 de marzo de 2020]; Disponible  
13 en: <http://link.springer.com/10.1007/s00134-020-05967-x>  
14  
15  
16  
17  
18  
19

20 23. Kumar A, Zarychanski R, Pinto R, Cook DJ, Marshall J, Lacroix J, et al.  
21 Critically ill patients with 2009 influenza A(H1N1) infection in Canada. JAMA.  
22 2009;302:1872-9.  
23  
24  
25

26 24. Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. Assessment of heart rate, acidosis,  
27 consciousness, oxygenation, and respiratory rate to predict noninvasive ventilation  
28 failure in hypoxemic patients. Intensive Care Med. 2017;43:192-9.  
29  
30  
31

32 25. Nin N, Soto L, Hurtado J, Lorente JA, Buroni M, Arancibia F, et al. Clinical  
33 characteristics and outcomes of patients with 2009 influenza A(H1N1) virus infection  
34 with respiratory failure requiring mechanical ventilation. J Crit Care. 2011;26:186-92.  
35  
36  
37

38 26. Roca O, Caralt B, Messika J, Samper M, Sztrymf B, Hernández G, et al. An  
39 Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-  
40 Flow Therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199:1368-76.  
41  
42  
43

44 27. Rodríguez A, Ferri C, Martín-Loeches I, Díaz E, Masclans JR, Gordo F, et al.  
45 Risk Factors for Noninvasive Ventilation Failure in Critically Ill Subjects With  
46 Confirmed Influenza Infection. Respir Care. 2017;62:1307-15.  
47  
48  
49

50 28. Frat J-P, Thille AW, Mercat A, Girault C, Ragot S, Perbet S, et al. High-flow  
51 oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med.  
52 2015;372:2185-96.  
53  
54  
55

56 29. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H, et al. Clinical course and outcomes of  
57 critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered,  
58 retrospective, observational study. The Lancet Respiratory Medicine.  
59  
60  
61  
62



Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

2020;S2213260020300795.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65

30. Scala R. Challenges on non-invasive ventilation to treat acute respiratory failure in the elderly. *BMC PulmMed* [Internet]. 2016 [citado 1 de diciembre de 2018];16. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111281/>

31. Wright BJ. Lung-protective Ventilation Strategies and Adjunctive Treatments for the Emergency Medicine Patient with Acute Respiratory Failure. *Emergency Medicine Clinics of North America*. 2014;32:871-87.

32. Tonetti T, Vasques F, Rapetti F, Maiolo G, Collino F, Romitti F, et al. Driving pressure and mechanical power: new targets for VILI prevention. *Ann Transl Med*. 2017;5:286-286.

33. Cortegiani A, Longhini F, Carlucci A, Scala R, Groff P, Bruni A, et al. High-flow nasal therapy versus noninvasive ventilation in COPD patients with mild-to-moderate hypercapnic acute respiratory failure: study protocol for a noninferiority randomized clinical trial. *Trials*. 2019;20:450.

34. Yuste ME, Moreno O, Narbona S, Acosta F, Peñas L, Colmenero M. Efficacy and safety of high-flow nasal cannula oxygen therapy in moderate acute hypercapnic respiratory failure. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2019;31:156-63.

35. Sun J, Li Y, Ling B, Zhu Q, Hu Y, Tan D, et al. High flow nasal cannula oxygen therapy versus non-invasive ventilation for chronic obstructive pulmonary disease with acute-moderate hypercapnic respiratory failure: an observational cohort study. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2019;14:1229-37.

36. Ricard J-D, Dib F, Esposito-Farese M, Messika J, Girault C, REVA network. Comparison of high flow nasal cannula oxygen and conventional oxygen therapy on ventilatory support duration during acute-on-chronic respiratory failure: study protocol of a multicentre, randomised, controlled trial. The «HIGH-FLOW ACRF» study. *BMJ Open*. 2018;8:e022983.

37. Respiratory care committee of Chinese Thoracic Society. [Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected by 2019 novel coronavirus pneumonia]. *ZhonghuaJie He He Hu Xi Za Zhi*. 2020;17:E020.

38. Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, et al. The SARS,

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? *Int J Epidemiol.* 2020;

39. Ministerio de Sanidad. Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19.

Disponible:[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento\\_Control\\_Infeccion.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf)

40. WHO. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Disponible en:

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE\\_use-2020.1-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf)

41. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2020 [citado 3 de marzo de 2020]. Disponible en:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html>

42. Leung CCH, Joynt GM, Gomersall CD, Wong WT, Lee A, Ling L, et al. Comparison of high-flow nasal cannula versus oxygen face mask for environmental bacterial contamination in critically ill pneumonia patients: a randomized controlled crossover trial. *Journal of Hospital Infection.* 2019;101:84-7.

43. Hui DS, Chow BK, Ng SS, Chu LCY, Hall SD, Gin T, et al. Exhaled Air Dispersion Distances During Noninvasive Ventilation via Different Respironics Face Masks. *Chest.* 2009;136:998-1005.

44. Hui DS, Hall SD, Chan MTV, Chow BK, Tsou JY, Joynt GM, et al. Noninvasive Positive-Pressure Ventilation. *Chest.* 2006;130:730-40.

45. Lellouche F, L'Her E, Abroug F, Deye N, Rodriguez PO, Rabbat A, et al. Impact of the humidification device on intubation rate during noninvasive ventilation with ICU ventilators: results of a multicenter randomized controlled trial. *Intensive Care Med.* 2014;40:211-9.

46. Cheung JC-H, Ho LT, Cheng JV, Cham EYK, Lam KN. Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. *The Lancet Respiratory Medicine.* 2020;S2213260020300849.

47. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005)

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

1 Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)  
2 [Internet]. [citado 4 de marzo de 2020]. Disponible en: [https://www.who.int/news-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
3 [room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
4 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
5 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
6 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
7 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
8 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
9 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
10 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
11 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
12 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
13 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
14 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
15 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
16 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
17 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
18 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
19 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
20 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
21 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
22 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
23 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
24 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
25 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
26 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
27 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
28 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
29 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
30 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
31 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
32 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
33 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
34 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
35 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
36 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
37 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
38 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
39 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
40 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
41 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
42 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
43 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
44 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
45 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
46 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
47 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
48 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
49 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
50 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
51 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
52 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
53 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
54 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
55 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
56 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
57 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
58 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
59 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
60 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
61 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
62 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
63 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
64 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
65 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))  
66 [regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

49. Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, 7:CD006207).

50. Tran K, Cimon K, Severn M et al. Aerosol-generating procedures and risk of transmission of acute respiratory diseases: a systematic review. Ottawa, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2011 ([http://www.cadth.ca/media/pdf/M0023\\_\\_Aerosol\\_Generating\\_Procedures\\_e.pdf](http://www.cadth.ca/media/pdf/M0023__Aerosol_Generating_Procedures_e.pdf)).

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

## ANEXO I: Resumen de los procedimientos de generación de aerosoles y riesgo de transmisión de respiratorias agudas

Resultados de estudios seleccionados en la revisión sistemática, que midieron el riesgo de la transmisión del SARS a los trabajadores de la salud que estuvieron expuestos a los procedimientos enumerados en comparación con los trabajadores que no estaban expuestos a los mismos procedimientos<sup>49,50</sup>.

Procedimientos de generación de aerosol	Tipo de Estudios	ODDS Ratio (IC 95%)
<i>Intubación orotraqueal</i>	4 estudios de cohorte	3,0 (1,4-6,7)
		22,8 (3,9-131,1)
		13,8 (1,2-167,7)
		5,5 (0,6-49,5)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =39,6%)</b>	6,6 (2,3 - 18,9)
<i>Intubación orotraqueal</i>	4 estudios de casos-control	0,7 (0,1-3,9)
		9,2 (4,2-20,2)
		8,0 (3,9-16,6)
		9,3 (2,9-30,2)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =61,4%)</b>	6,6 (4,1 - 10,6)
<i>Aspiración previa a la intubación</i>	2 estudios de cohorte	13,8 (1,2-161,7)
		1,7 (0,7-4,2)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =59,2%)</b>	3,5 (0,5 - 24,6)
<i>Aspiración tras la intubación</i>	2 estudios de cohorte	0,6 (0,1-3,0)
		1,8 (0,8-4,0)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =28,8%)</b>	1,3 (0,5 - 3,4)
<i>Nebulizaciones</i>	3 estudios de cohorte	6,6 (0,9-50,5)
		0,1 (0-1,0)

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

		1,2 (0,1-20,7)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =73,1%)</b>	0,9 (0,1 - 13,6)
<i>Broncoscopia</i>	2 estudios de cohorte	3,3 (0,2-59,6)
		1,1 (0,1-18,5)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =0%)</b>	1,9 (0,2 - 14,2)
<i>Aspiraciones endotraqueales</i>	1 estudio de cohorte	1,0 (0,2-5,2)
<i>Terapia de alto flujo con Cánulas Nasales</i>	1 estudio de cohorte	0,4 (0,1-1,7)
<i>Ventilación Mecánica No invasiva</i>	2 estudios de cohorte	2,6 (0,2-34,5)
		3,2 (1,4-7,2)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =0%)</b>	3,1 (1,4 - 6,8)
<i>Administración de oxígeno</i>	1 estudio de casos-controles	1,0 (0,3 - 2,8)
<i>Compresiones torácicas</i>	1 estudio de casos-controles	4,5 (1,5-13,8)
<i>Compresiones torácicas</i>	2 estudios de cohorte	3,0 (0,4-24,5)
		0,4 (0,0-7,8)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =27,3%)</b>	1,4 (0,2 - 11,2)
<i>Desfibrilación</i>	2 estudios de cohorte	0,5 (0,0-12,2)
		7,9 (0,8-79,0)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =55,3%)</b>	2,5 (0,1- 43,9)
<i>Traqueotomía</i>	1 estudio de casos-controles	4,2 (1,5-11,5)
<i>Manipulación de mascarilla de VMNI</i>	1 estudio de cohortes	4,3 (0,6-27,4)
<i>Ventilación mecánica</i>	1 estudio de cohortes	0,9 (0,4-2,0)
<i>Ventilación manual antes de la intubación</i>	1 estudio de cohortes	2,8 (1,3-6,4)
<i>Recogida de muestra de esputo</i>	1 estudio de cohortes	2,7 (0,9-8,2)
<i>Inserción de sonda nasogástrica</i>	2 estudio de cohortes	1,7 (0,2-11,5)
		1,0 (0,2-4,5)
	<b>Efecto agrupado (I<sup>2</sup> =0%)</b>	1,2 (0,4 - 4,0)

Recomendaciones de consenso respecto al SRNI en el paciente adulto  
con IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2

Abreviaturas:  $I^2$ , índice de heterogeneidad estadística; IC, Intervalo de confianza.

ORCID

Dr Manel Lujan Torne:

0000-0001-9033-7712

Dr. Oscar Peñuelas: 0000-0003-1484-3933

# Ética de la publicación

1. ¿Su trabajo ha comportado experimentación en animales?:

**No**

2. ¿En su trabajo intervienen pacientes o sujetos humanos?:

**No**

3. ¿Su trabajo incluye un ensayo clínico?:

**No**

4. ¿Todos los datos mostrados en las figuras y tablas incluidas en el manuscrito se recogen en el apartado de resultados y las conclusiones?:

**Sí**